

WAS SIND BESENREISER ?

Viele Menschen wünschen sich schöne Beine ohne störende Äderchen. Leider entwickeln mehr als 70% der Erwachsenen genetisch veranlagt im Laufe des Lebens sichtbar erweiterte Venen der oberen Hautschicht. Vor allem Frauen fühlen sich im Sommer dadurch in ihrer Kleidungswahl oder am Strand eingeschränkt. Viele Betroffene wissen allerdings nicht, dass die Beseitigung von Besenreisern mit einfachen und risikolosen Behandlungsverfahren möglich ist.

WELCHE HAUTVERÄNDERUNGEN SIND BEHANDELBAR?

Adern bis zu einem Durchmesser unter 3 mm, die nicht zu Beschwerden wie geschwollenen, schweren Beinen (also „echte“ Krampfadern) führen.

WELCHE METHODEN STEHEN IHNEN IN UNSERER PRAXIS ZUR VERFÜGUNG?

Die Mikro-Sklerotherapie („Verödung“) oder Lasern mit dem KTP-Gefäßlaser. Oft ist die Kombination aus beiden Verfahren sinnvoll. Generell ist die Sklerotherapie besser in der Lage, die größeren, violett-bläulichen Äderchen zu beseitigen. Sehr feine rötliche Besenreiser sprechen dagegen besser auf den Laser an.



WIE FUNKTIONIERT DIE SKLEROTHERAPIE (VERÖDUNG) ?

Durch die Injektion von Aethoxysklerol-Lösung in die oberflächlich störenden Gefäße reagieren die Innenwände und verkleben schmerzlos miteinander.

WIE FUNKTIONIERT DIE LASERTHERAPIE?

Durch die intensive Strahlung des Lasers verkleben die Adern miteinander. Außer einem leichten Ziepen ist die Behandlung schmerzlos. Eine Brille muss zum Schutz der Augen während der Behandlung getragen werden.

WARUM WERDEN DIE ERFOLGE DER BEHANDLUNG NICHT SOFORT VOLLSTÄNDIG SICHTBAR?

Nach einer Laser- oder Verödungsbehandlung benötigt der Körper eine gewisse Zeit, um die Überreste der Besenreiser vollständig zu abbauen. Vorübergehend können nach beiden Therapieverfahren Hämatome (blaue Flecken) in den Behandlungsarealen entstehen. Der Behandlungserfolg ist daher erst nach Ablauf von ca. 6 Wochen vollständig sichtbar. Für eine ggf. notwendige Nachbehandlung ist dann der richtige Zeitpunkt.

WIE KÖNNEN SIE SELBST ZUM ERFOLG DER THERAPIE BEITRAGEN?

Je heller, und somit pigmentärmer die Haut ist, desto wirksamer ist das Lasern. Die Haut sollte ca. 4 Wochen vor Behandlungsbeginn keiner Sonne ausgesetzt sein.

Nach beiden Behandlungsmethoden sollen zur Unterstützung der Abbauprozesse Kompressionsstrümpfe, welche wir Ihnen gern beim Beratungsgespräch verordnen, getragen werden.

Übermäßiger Sport, Sauna und heiße Bäder sollten in den Tagen nach der Behandlung, Sonneneinstrahlung für 8 Wochen danach vermieden werden.

WER HILFT IHNEN BEI WEITEREN FRAGEN SOWIE DER AUSWAHL DER FÜR SIE BESTEN BEHANDLUNGSMETHODE?

In einem Erstgespräch beraten wir Sie gern über die für Sie optimale Behandlungsmethode. Je nach Ausgangsbefund der Äderchen sind oft mehrere Behandlungssitzungen im Abstand von 6 bis 8 Wochen erforderlich.

Die beste Therapiezeit für Besenreiser ist die lichtarme Jahreszeit (Ende September bis April).

