



DIE WOGEN GLÄTTEN...

Da im Laufe des Lebens der Feuchtigkeitsgehalt, die Kollagenproduktion und damit die Elastizität der Haut abnimmt, kommt es durch die Schwächung des Bindegewebes zu einer langsam fortschreitenden Hauterschlaffung mit Faltenbildung.

Eine gewünschte Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes mit dem Ziel eines frischeren, erholten Aussehens lässt sich durch seit nunmehr vielen Jahren bewährte effektive wie sichere Möglichkeiten der Faltenkorrektur mittels *Injektion von Hyaluronsäuren sowie Botulinum* – sowohl einzeln wie in Kombination – erreichen.

Wir bieten Ihnen in diesem Rahmen die Unterspritzung mit *Hyaluronsäuren u.a. aus der Restylane®-Serie* an. Sie sind für die verschiedensten Bedürfnisse geeignet – von der Volumenauffüllung über die Glättung häufig störender Nasolabialfalten bis hin zu flächenhaften Techniken zur Behandlung unerwünschter „Knitterfältchen“ z.B. im Bereich der Wangen. Hyaluronsäuren kommen in natürlicher Weise in unserem Körper vor, sie sind für die Wasserbindung u.a. in der Haut verantwortlich. Die Auffüllung von Hautbereichen mit unerwünschten Falten mittels Restylane® verhilft zu einer wiedergewonnenen Hautelastizität, Glättung der störenden Linien und Falten sowie einem jugendlicheren Aussehen. Ziel der Behandlung ist die Verbesserung des Hautbildes ohne eine drastische Veränderung Ihres eigenen natürlichen Gesichtsausdrucks.

Die *Wirkung von Hyaluronsäuren* ist lang anhaltend – je nach Lebensalter, Status des Hautbildes und Behandlungsbereich – über 8-12 Monate. Auf diese Weise können wir die Therapie gezielt auf die individuelle Veränderung Ihrer Gesichtsanatomie im Verlauf der Jahre zusammenstellen.

Neben der Behandlung mit Hyaluronsäuren ist *Botulinum (Botulinumtoxin Typ A, z.B. Azzalure®, Vistabel®)* in der Therapie von störenden Falten, die durch die individuelle Mimik des/der Einzelnen entstanden sind, ein fester, unverzichtbarer Bestandteil der ästhetischen Dermatologie geworden.

Der Wirkstoff wird bereits seit Jahrzehnten in wesentlich höherer Dosierung standardmäßig und erfolgreich zur Therapie neuromuskulärer Krankheiten eingesetzt. In der Behandlung mimischer Falten wie auch der Hyperhidrosis axillaris (übermäßige Schweißproduktion im Achselbereich) kann man nunmehr auf über 20 Jahre Erfahrung zurückblicken.

In kleinsten Dosen im Bereich der störenden Falten (klassische „Sorgenfalte“, quere Stirnfalten, Lachfältchen um die Augen) appliziert, verhindert es zeitlich begrenzt die Signalübertragung zwischen dem motorischen Nerven und seinem zugehörigen Muskel und glättet damit die Haut.

Die maximale Wirkung ist binnen 14 Tagen erreicht und hält – je nach aktiver Mimik des Individuums – bis zu 6 Monate an. Nachgewiesenermaßen wird z.B. eine Sorgenfalte nach wiederholter Behandlung mit Botulinum immer flacher und gelangt nicht mehr zu ihrer vollen ehemaligen Ausprägung.

Beide Ärztinnen arbeiten seit über zehn Jahren erfolgreich mit Hyaluronsäuren und Botulinumtoxin. Sollten Sie sich für eine Behandlung interessieren, sprechen Sie Ihr Anliegen gerne offen und unverbindlich in der Sprechstunde an.

Die Behandlung selber ist unkompliziert ohne Ausfallzeiten in Ihren privaten wie beruflichen Alltag zu integrieren.